

# 瀬田川プランクトン調査結果速報

～第38報～

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター  
環境監視部門 生物圏係  
平成28年12月19日

## 1. 最も数が多かった種類(優占種)

### 植物プランクトン第1優占種



*Uroglena americana*  
(ウログレナ)  
黄色鞭毛藻類

楕円形または倒卵形の細胞が寒天質の表層に規則正しく配列し、球状の群体を形成する。各細胞は不等長の2本の鞭毛を有する。生ぐさ臭を発生し、水道水の異臭味の原因となる藻類である。

### 動物プランクトン第1優占種



*Polyarthra vulgaris*  
(ハネウデワムシ)  
輪虫類

体は四角く、4カ所に3本ずつ鳥の羽状の付属物を有する。前部に2本の触角がある。琵琶湖、瀬田川で見られるワムシのなかまの中で最も多く見られる種類である。

#### コメント

植物プランクトンでは、黄色鞭毛藻に属し、生ぐさ臭の原因となるウログレナ(*Uroglena americana*)が優占種となった。体積で見ても、ウログレナが優占種となった。先週まで多く見られた緑藻に属するヒザオリ(*Mougeotia* sp.)は大きく減少した。網別の体積では、黄色鞭毛藻類が総体積の約49%、褐色鞭毛藻類が約26%、珪藻類が約13%を占めた。動物プランクトンでは、ワムシ類のハネウデワムシ(*Polyarthra vulgaris*)が200個体/Lで優占種となった。ピコ植物プランクトンは、36,000細胞/mLで、そのうち輝橙色のものが92%、深赤色のものが8%であった。

## 2. 見つかった主なプランクトンとその数(個体数)

### (1) 動物プランクトン

第 1 優 占 種		個体数 (個体/L)
ワムシ類	<i>Polyarthra vulgaris</i>	200

第 2 優 占 種		個体数 (個体/L)
繊毛虫類	<i>Pelagodileptus trachelioides</i>	100

\* 個体数については、プランクトンネットNXXX25(目合い41μm)で採取したものを直接検鏡して計測した。

# 瀬田川植物プランクトン調査結果速報

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター  
環境監視部門 生物圏係

## (2) 植物プランクトン

平成28年12月19日

第38報

(綱) 種 名	細胞数 (群体数)		
		数	体積
(黄鞭) <i>Uroglena americana</i>	1500	◎	◎
(黄鞭) <i>Chrysamoeba radians</i>	120		
(黄鞭) <i>Mallomonas</i> sp.	40		
(黄鞭) <i>Synura petersenii</i>	16		
(珪) <i>Aulacoseira granulata</i> var. <i>angustissima</i>	35		
(珪) <i>Cyclotella</i> sp.	340		
(珪) <i>Urosolenia longiseta</i>	10		
(珪) <i>Asterionella gracillima</i>	8		
(珪) <i>Synedra acus</i>	1		
(珪) <i>Cocconeis placentula</i>	20		
(珪) <i>Navicula</i> sp.	20		
(珪) <i>Nitzschia acicularis</i>	20		
(渦) <i>Gymnodinium</i> sp.	10		
(褐) <i>Cryptomonas</i> sp.	200		○
(褐) <i>Rhodomonas</i> sp.	680	○	
(緑) <i>Chlamydomonas</i> sp.	20		
(緑) <i>Tetraspora lacustris</i>	150		
(緑) <i>Micractinium pusillum</i>	160		
(緑) <i>Monoraphidium tortile</i>	10		
(緑) <i>Mougeotia</i> sp.	45		
(緑) <i>Micrasterias hardyi</i>	1		
(緑) <i>Staurastrum dorsidentiferum</i> var. <i>ornatum</i>	3		
(他) <i>Merotrichia capitata</i>	10		
(藍) 藍藻綱	0	0.0	0.0
(黄) 黄緑藻綱	0	0.0	0.0
(黄鞭) 黄色鞭毛藻綱	1676	49.0	29.7
(珪) 珪藻綱	454	13.3	12.8
(渦) 渦鞭毛藻綱	10	0.3	0.8
(褐) 褐色鞭毛藻綱	880	25.7	28.7
(み) みどり虫藻綱	0	0.0	0.0
(緑) 緑藻綱	389	11.4	22.5
(他) その他のプランクトン	10	0.3	5.5
総 細 胞 数	3419	総体積	1.59E+06
種 類 数	23	(μm <sup>3</sup> )	

- 注1) 細胞数の単位は(細胞/mL)  
ただし\*印の種は群体数(群体/mL)
- 注2) 優占種は◎が第1優占種、○が第2優占種  
数字は各綱ごとの占有率(単位:%)
- 注3) 細胞体積は、顕微鏡観察による画像から  
試験的に推定した概算値である。



ピコ植物プランクトン  
1,000倍G励起で撮影

## (3) 見つかったピコ植物プランクトンとその数(細胞数)

ピコ植物プランクトン数	12月19日 細胞数/mL
藍藻類 <i>Synechococcus</i> sp.	36,000

注1) プランクトンを大きさ別に分類したとき、大きさが0.2~2μm(1μmは1mmの1,000分の1)の最も小さなランクのものをピコプランクトンと呼んでいます。この中で光合成色素を持つものをピコ植物プランクトンと呼んでいます。ピコ植物プランクトンは細菌と同じくらい小さいので、落射蛍光顕微鏡を用いて観察し計数します。G励起(緑色光照射)で輝橙色に輝く種類と深赤色に見える種類があります。