


瀬田川プランクトン調査結果速報

～第11報～

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター
環境監視部門 生物圏係
平成30年6月11日

1. 最も数が多かった種類(優占種)

植物プランクトン第1優占種



Aulacoseira granulata
(アウラコセイラ)
珪藻綱

細胞は円筒形で、糸状の群体を形成する。殻の側壁に斜めに走る点紋列がある。群体の両端に顕著な長い棘状突起を有する。

動物プランクトン第1優占種



Raphidiophrys sp.
(ラフィディオフリス)
太陽虫類

体は球形で放射状に有軸仮足を出す。有軸仮足の根元は粘液と多数の骨片におおわれている。

コメント

植物プランクトンは、少なく珪藻に属するアウラコセイラ (*Aulacoseira granulata*) が優占種となった。体積で見ると緑藻に属するスタウラスツルム (*Staurastrum dorsidentiferum* var. *ornatum*) が優占種となった。網別の体積では、緑藻類が総体積の約45%、珪藻類が約33%、渦鞭毛藻類が約16%を占めた。動物プランクトンでは、太陽虫類のラフィディオフリス (*Raphidiophrys* sp.) が460個体/Lで優占種となった。ピコ植物プランクトンは、33,000細胞/mlとなり、輝橙色のものが72%、深赤色のものが28%であった。

2. 見つかった主なプランクトンとその数(個体数)

(1) 動物プランクトン

第 1 優 占 種		個体数 (個体/L)
太陽虫類	<i>Raphidiophrys</i> sp.	460

第 2 優 占 種		個体数 (個体/L)
繊毛虫類	<i>Codonella cratera</i>	180

* 個体数は、プランクトンネットNXXX25(目合い41μm)で1000倍濃縮したものを直接検鏡して計測した。

瀬田川植物プランクトン調査結果速報

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター
環境監視部門 生物圏係


(2) 植物プランクトン

平成30年6月11日

第11報

(綱) 種 名	細胞数 (群体数)	数	
		数	体積
(藍) <i>Anabaena</i> sp.*	6		
(黄鞭) <i>Mallomonas</i> sp.	10		
(珪) <i>Melosira varians</i>	3		
(珪) <i>Aulacoseira granulata</i>	240	◎	○
(珪) <i>Aulacoseira granulata</i> var. <i>angustissima</i>	60		
(珪) <i>Aulacoseira ambigua</i>	52		
(珪) <i>Cyclotella</i> sp.	20		
(珪) <i>Stephanodiscus pseudosuzukii</i>	20		
(珪) <i>Acanthoceras zachariasii</i>	30		
(珪) <i>Fragilaria crotonensis</i>	15		
(珪) <i>Synedra acus</i>	1		
(珪) <i>Nitzschia holsatica</i>	8		
(渦) <i>Ceratium hirundinella</i>	8		
(褐) <i>Cryptomonas</i> sp.	30		
(緑) <i>Micractinium pusillum</i>	40		
(緑) <i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	130	○	
(緑) <i>Mougeotia</i> sp.	20		
(緑) <i>Closterium aciculare</i> var. <i>subpronum</i>	1		
(緑) <i>Micrasterias hardyi</i>	2		
(緑) <i>Staurastrum dorsidentiferum</i> var. <i>ornatum</i>	12		◎
(緑) <i>Staurastrum arctiscon</i>	1		
(藍) 藍藻綱	6	0.8	1.1
(黄) 黄緑藻綱	0	0.0	0.0
(黄鞭) 黄色鞭毛藻綱	10	1.4	0.6
(珪) 珪藻綱	449	63.3	33.3
(渦) 渦鞭毛藻綱	8	1.1	16.4
(褐) 褐色鞭毛藻綱	30	4.2	3.5
(み) みどり虫藻綱	0	0.0	0.0
(緑) 緑藻綱	206	29.1	45.1
(他) その他のプランクトン	0	0.0	0.0
総 細 胞 数	709	総体積	1.46E+06
種 類 数	21	(μm ³)	

- 注1) 細胞数の単位は(細胞/mL)
ただし*印の種は群体数(群体/mL)
- 注2) 優占種は◎が第1優占種、○が第2優占種
数字は各綱ごとの占有率(単位: %)
- 注3) ★: 異臭味原因プランクトン
- 注4) 細胞体積は、顕微鏡観察による画像から
試験的に推定した概算値である。



ピコ植物プランクトン
1,000倍G励起で撮影

(3) 見つかったピコ植物プランクトンとその数(細胞数)

ピコ植物プランクトン種	6月11日 細胞数/mL
藍藻類 <i>Synechococcus</i> sp.	33,000

注1) プランクトンを大きさ別に分類したとき、大きさが0.2~2μm(1μmは1mmの1,000分の1)の最も小さなランクのものをピコプランクトンと呼んでいます。この中で光合成色素を持つものをピコ植物プランクトンと呼んでいます。ピコ植物プランクトンは細菌と同じくらい小さいので、落射蛍光顕微鏡を用いて観察し計数します。G励起(緑色光照射)で輝橙色に輝く種類と深赤色に見える種類があります。