


瀬田川プランクトン調査結果速報

～ 第8報 ～

滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター
環境生物担当
平成18年5月22日

1. 最も数が多かった種類 (優占種)

植物プランクトン第1優占種



Uroglena americana
(ウログレナ)
黄色鞭毛藻類

楕円形の細胞が球状の寒天質の表層に規則正しく配列し、球状の群体を形成する。各細胞は不等長の2本の鞭毛を有する。

動物プランクトン第1優占種



Polyarthra vulgaris
(ハネウデワムシ)
輪虫類

体は四角く、横に鳥の羽状の付属物が4ヶ所付いている。
前部に2本の触角がある。

コメント

植物プランクトンは、淡水赤潮の原因となるウログレナ (*Uroglena americana*) が3,300細胞/mlと多く計数された。特に現在は大型の群体が見られている。アナベナで螺旋状に巻いた群体の種が今年度初めて見られた。動物プランクトンは、ワムシ類に属するハネウデワムシ (*Polyarthra vulgaris*) が最も多く、次いでドロワムシ (*Synchaeta stylata*) が多かった。ピコ植物プランクトンは、前回よりも減少した。

2. 見つかった主なプランクトンとその数 (個体数)

(1) 動物プランクトン

第 1 優 占 種		個体数 (個体 / l)
輪虫類	<i>Polyarthra vulgaris</i>	480

第 2 優 占 種		個体数 (個体 / l)
輪虫類	<i>Synchaeta stylata</i>	140

* 個体数については、プランクトンネットで採取したものを直接検鏡して計測した。

瀬田川植物プランクトン調査結果速報

滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター
環境生物担当


(2) 植物プランクトン

平成18年5月22日

第8報

(綱) 種 名	細胞数 (群体数)	優占種(占有率)	
		数	体積
(藍) <i>Anabaena</i> sp. *	1		
(黄鞭) <i>Uroglena americana</i>	3300		
(黄鞭) <i>Chrysamoeba radians</i>	10		
(珪) <i>Melosira varians</i>	20		
(珪) <i>Cyclotella</i> sp.	10		
(珪) <i>Stephanodiscus carconensis</i> var. <i>pusilla</i>	10		
(珪) <i>Fragilaria crotonensis</i>	160		
(珪) <i>Asterionella formosa</i>	40		
(珪) <i>Synedra</i> sp.	10		
(珪) <i>Navicula</i> sp.	10		
(渦) <i>Peridinium berolinense</i>	10		
(渦) <i>Peridinium penardiforme</i>	10		
(渦) <i>Ceratium hirundinella</i>	3		
(褐) <i>Cryptomonas</i> sp.	60		
(褐) <i>Rhodomonas</i> sp.	60		
(緑) <i>Chlamydomonas</i> sp.	30		
(緑) <i>Pediastrum biwae</i>	40		
(緑) <i>Closterium aciculare</i> var. <i>subpronum</i>	4		
(藍) 藍藻綱	1	0.0	0.4
(黄) 黄緑藻綱	0	0.0	0.0
(黄鞭) 黄色鞭毛藻綱	3310	87.4	64.8
(珪) 珪藻綱	260	6.9	11.2
(渦) 渦鞭毛藻綱	23	0.6	7.7
(褐) 褐色鞭毛藻綱	120	3.2	8.5
(み) みどり虫藻綱	0	0.0	0.0
(緑) 緑藻綱	74	2.0	7.3
(他) その他のプランクトン	0	0.0	0.0
総細胞数	3788	総体積 (μm^3)	1.31E+06
種類数	18		

- 注1) 細胞数の単位は(細胞/ml)
ただし*印の種は群体数(群体/ml)
- 注2) 優占種は が第1優占種、 が第2優占種
数字は各綱ごとの占有率(単位:%)
- 注3) 細胞体積は、顕微鏡観察による画像から
試験的に推定した概算値である。



ピコ植物プランクトン
1,000倍G 励起で撮影

(3) 見つかったピコ植物プランクトンとその数(細胞数)

ピコ植物プランクトン数	5月22日 細胞数/ml
藍藻類 <i>Synechococcus</i> sp.	3,500

注1) プランクトンを大きさ別に分類したとき、大きさが0.2~2 μm (1 μm は1mmの1,000分の1)の最も小さなランクのものをピコプランクトンと呼んでいます。この中で光合成色素を持つものをピコ植物プランクトンと呼んでいます。ピコ植物プランクトンは細菌と同じくらい小さいので、落射蛍光顕微鏡を用いて観察し計数します。