

瀬田川プランクトン調査結果速報


～第40報～

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター
生物圏担当

平成21年1月5日

1. 最も数が多かった種類(優占種)

植物プランクトン第1優占種



Uroglena americana

(ウログレナ)

黄色鞭毛藻類

楕円形の細胞が球状の寒天質の表層に規則正しく配列し、球状の群体を形成する。各細胞は不等長の2本の鞭毛を有する。

動物プランクトン第1優占種



Polyarthra vulgaris

(ハネウデワムシ)

輪虫類

体は四角く、横に鳥の羽状の付属物が4ヶ所付いている。
前部に2本の触角がある。

コメント

植物プランクトンは、先週に引き続き黄色鞭毛藻に属するウログレナが優占種となった。本種は昨年12月8日から連続して優占種となり、増加傾向にある。動物プランクトンも、先週に引き続きハネウデワムシが220個体/L計数され優占種となった。ピコ植物プランクトンは、黄橙色のものが800細胞/ml計数され、深赤色のものは計数されなかった。

2. 見つかった主なプランクトンとその数(個体数)

(1) 動物プランクトン

第 1 優 占 種		個体数 (個体/l)
輪虫類	<i>Polyarthra vulgaris</i>	220

第 2 優 占 種		個体数 (個体/l)
輪虫類	<i>Synchaeta oblonga</i>	80

* 個体数については、プランクトンネットで採取したものを直接検鏡して計測した。

瀬田川植物プランクトン調査結果速報

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター
生物圏担当

(2) 植物プランクトン

平成21年1月5日

第40報

(綱) 種 名	細胞数 (群体数)		
		数	体積
(藍) <i>Chroococcus dispersus*</i>	20		
(黄鞭) <i>Uroglena americana</i>	3700	◎	◎
(黄鞭) <i>Mallomonas tonsurata</i>	20		
(黄鞭) <i>Mallomonas</i> sp.	20		
(珪) <i>Cyclotella glomerata</i>	40		
(珪) <i>Cyclotella</i> sp.	80		
(珪) <i>Fragilaria crotonensis</i>	40		
(珪) <i>Fragilaria capucina</i>	120		
(珪) <i>Asterionella formosa</i>	480	○	
(珪) <i>Synedra</i> sp.	10		
(珪) <i>Navicula</i> sp.	10		
(珪) <i>Nitzschia acicularis</i>	40		
(珪) <i>Nitzschia</i> sp.	20		
(褐) <i>Cryptomonas</i> sp.	260		○
(褐) <i>Rhodomonas</i> sp.	440		
(緑) <i>Dimorphococcus lunatus</i>	40		
(藍) 藍藻綱	20	0.4	1.0
(黄) 黄緑藻綱	0	0.0	0.0
(黄鞭) 黄色鞭毛藻綱	3740	70.0	53.8
(珪) 珪藻綱	840	15.7	16.1
(渦) 渦鞭毛藻綱	0	0.0	0.0
(褐) 褐色鞭毛藻綱	700	13.1	28.1
(み) みどり虫藻綱	0	0.0	0.0
(緑) 緑藻綱	40	0.7	1.0
(他) その他のプランクトン	0	0.0	0.0
総 細胞 数	5340	総体積	1.84E+06
種 類 数	16	(μm ³)	

- 注1) 細胞数の単位は(細胞/ml)
ただし*印の種は群体数(群体/ml)
- 注2) 優占種は◎が第1優占種、○が第2優占種
数字は各綱ごとの占有率(単位: %)
- 注3) 細胞体積は、顕微鏡観察による画像から
試験的に推定した概算値である。



ピコ植物プランクトン
1,000倍G励起で撮影

(3) 見つかったピコ植物プランクトンとその数(細胞数)

ピコ植物プランクトン数	1月5日 細胞数/ml
藍藻類 <i>Synechococcus</i> sp.	800

注1) プランクトンを大きさ別に分類したとき、大きさが0.2~2 μm(1 μmは1mmの1,000分の1)の最も小さなランクのものをピコプランクトンと呼んでいます。この中で光合成色素を持つものをピコ植物プランクトンと呼んでいます。ピコ植物プランクトンは細菌と同じくらい小さいので、落射蛍光顕微鏡を用いて観察し計数します。