

# 瀬田川プランクトン調査結果速報

～第35報～

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター  
生物圏担当  
平成21年11月30日

## 1. 最も数が多かった種類(優占種)


### 植物プランクトン第1優占種



*Uroglena americana*  
(ウログレナ)  
黄色鞭毛藻類

楕円形の細胞が球状の寒天質の表層に規則正しく配列し、球状の群体を形成する。各細胞は不等長の2本の鞭毛を有する。

### 動物プランクトン第1優占種



*Actinophrys sp.*  
(アクチノフリス)  
太陽虫類

体は球形であり、多数の偽足が放射状に伸びている。原形質は裸で殻や鱗片をもたない。

#### コメント

植物プランクトンでは、黄色鞭毛藻に属するウログレナ(*Uroglena americana*)が優占種となった。体積で見ると緑藻に属するスタウラスツルムが優占種であった。緑藻類が総体積の約52%、黄色鞭毛藻類が約30%を占めた。動物プランクトンでは、太陽虫類のアクチノフリスが960個体/Lで優占種となった。ピコ植物プランクトンは、輝橙色のものが2,500細胞/ml計数され、深赤色のものは見られなかった。

## 2. 見つかった主なプランクトンとその数(個体数)

### (1) 動物プランクトン

第 1 優 占 種		個体数 (個体/l)
肉質虫類	<i>Actinophrys sp.</i>	960

第 2 優 占 種		個体数 (個体/l)
繊毛虫類	<i>Codonella cratera</i>	260

\* 個体数については、プランクトンネットで採取したものを直接検鏡して計測した。

# 瀬田川植物プランクトン調査結果速報

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター  
生物圏担当

## (2) 植物プランクトン

平成21年11月30日

第35報

(綱) 種 名	細胞数 (群体数)		
		数	体積
(藍) <i>Microcystis incerta*</i>	1		
(黄鞭) <i>Uroglena americana</i>	300	◎	
(黄鞭) <i>Dinobryon divergens</i>	32		
(黄鞭) <i>Dinobryon cylindricum</i>	10		
(黄鞭) <i>Mallomonas fastigata</i>	2		
(黄鞭) <i>Mallomonas akrokomos</i>	1		
(珪) <i>Melosira varians</i>	6		
(珪) <i>Aulacoseira granulata</i> var. <i>angustissima</i>	35		
(珪) <i>Cyclotella glomerata</i>	30		
(珪) <i>Asterionella formosa</i>	14		
(珪) <i>Synedra acus</i>	1		
(珪) <i>Cymbella ventricosa</i>	3		
(珪) <i>Nitzschia acicularis</i>	2		
(渦) <i>Ceratium hirundinella</i>	1		
(褐) <i>Cryptomonas</i> sp.	20		
(褐) <i>Rhodomonas</i> sp.	60		
(緑) <i>Eudorina elegans</i>	32		
(緑) <i>Tetraspora lacustris</i>	64	○	
(緑) <i>Oocystis</i> sp.	2		
(緑) <i>Scenedesmus intermedius</i>	4		
(緑) <i>Mougeotia</i> sp.	46		○
(緑) <i>Closterium aciculare</i> var. <i>subpronum</i>	3		
(緑) <i>Staurastrum dorsidentiferum</i> var. <i>ornatum</i>	4		◎
(緑) <i>Cosmocladium constrictum</i>	24		
(藍) 藍藻綱	1	0.1	0.7
(黄) 黄緑藻綱	0	0.0	0.0
(黄鞭) 黄色鞭毛藻綱	345	49.5	29.9
(珪) 珪藻綱	91	13.1	6.2
(渦) 渦鞭毛藻綱	1	0.1	4.4
(褐) 褐色鞭毛藻綱	80	11.5	6.5
(み) みどり虫藻綱	0	0.0	0.0
(緑) 緑藻綱	179	25.7	52.1
(他) その他のプランクトン	0	0.0	0.0
総 細 胞 数	697	総体積	6.75E+05
種 類 数	24	(μm <sup>3</sup> )	

- 注1) 細胞数の単位は(細胞/ml)  
ただし \* 印の種は群体数(群体/ml)
- 注2) 優占種は◎が第1優占種、○が第2優占種  
数字は各綱ごとの占有率(単位: %)
- 注3) 細胞体積は、顕微鏡観察による画像から  
試験的に推定した概算値である。



ピコ植物プランクトン  
1,000倍G励起で撮影

## (3) 見つかったピコ植物プランクトンとその数(細胞数)

ピコ植物プランクトン数	11月30日 細胞数/ml
藍藻類 <i>Synechococcus</i> sp.	2,500

注1) プランクトンを大きさ別に分類したとき、大きさが0.2~2μm(1μmは1mmの1,000分の1)の最も小さなランクのものをピコプランクトンと呼んでいます。この中で光合成色素を持つものをピコ植物プランクトンと呼んでいます。ピコ植物プランクトンは細菌と同じくらい小さいので、落射蛍光顕微鏡を用いて観察し計数します。