

瀬田川プランクトン調査結果速報

～第33報～

滋賀県琵琶湖環境科学センター
生物圏担当

平成22年11月15日

1. 最も数が多かった種類(優占種)

植物プランクトン第1優占種



Aulacoseira granulata

(アウラコセイラ)

珪藻綱

細胞は円筒形で、糸状の群体を形成する。群体の両端に顕著な長い棘状突起を有する。メロシラ グラヌラータとも呼ばれる。

動物プランクトン第1優占種



Acanthocystis sp.

(アカンソキスティス)

肉質虫類

太陽虫のなかまで、直径20 μ m程度の球形の細胞からその2倍以上の有軸仮足が放射状に伸びている。また、細胞の周囲は珪酸質の骨片に覆われている。

コメント

植物プランクトンでは、引き続き珪藻に属するアウラコセイラ (*Aulacoseira granulata*) が優占種となった。体積で見てもアウラコセイラ (*Aulacoseira granulata*) が優占種となった。綱別の体積では、珪藻類が総体積の約68%、褐色鞭毛藻類が約14%、黄色鞭毛藻類が約11%を占めた。動物プランクトンは少なく、太陽虫のなかまのアカンソキスティス (*Acanthocystis* sp.) が60個体/Lで優占種となった。ピコ植物プランクトンは、輝橙色のものが13,000細胞/ml、深赤色のものが1,000細胞/ml計数され、合計14,000細胞/mlとなった。

2. 見つかった主なプランクトンとその数(個体数)

(1) 動物プランクトン

第 1 優 占 種		個体数 (個体/l)
肉質虫類	<i>Acanthocystis</i> sp.	60

第 2 優 占 種		個体数 (個体/l)
輪虫類	<i>Conochilus unicornis</i>	30

* 個体数については、プランクトンネットで採取したものを直接検鏡して計測した。

瀬田川植物プランクトン調査結果速報

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター
生物圏担当

(2) 植物プランクトン

平成22年11月15日

第33報

(綱) 種 名	細胞数 (群体数)		
		数	体積
(黄鞭) <i>Uroglena americana</i>	10		
(黄鞭) <i>Mallomonas fastigata</i>	10		
(珪) <i>Aulacoseira granulata</i>	220	◎	◎
(珪) <i>Cyclotella glomerata</i>	50		
(珪) <i>Acanthoceras zachariasii</i>	10		
(珪) <i>Synedra acus</i>	1		
(珪) <i>Cocconeis placentula</i>	40		○
(珪) <i>Navicula</i> sp.	20		
(珪) <i>Nitzschia</i> sp.	10		
(褐) <i>Cryptomonas</i> sp.	50		
(褐) <i>Rhodomonas</i> sp.	190	○	
(緑) <i>Mougeotia</i> sp.	6		
(緑) <i>Closterium aciculare</i> var. <i>subpronum</i>	1		
(緑) <i>Staurastrum dorsidentiferum</i> var. <i>ornatum</i>	1		
(藍) 藍藻綱	0	0.0	0.0
(黄) 黄緑藻綱	0	0.0	0.0
(黄鞭) 黄色鞭毛藻綱	20	3.2	11.2
(珪) 珪藻綱	351	56.7	67.8
(渦) 渦鞭毛藻綱	0	0.0	0.0
(褐) 褐色鞭毛藻綱	240	38.8	14.2
(み) みどり虫藻綱	0	0.0	0.0
(緑) 緑藻綱	8	1.3	6.8
(他) その他のプランクトン	0	0.0	0.0
総 細 胞 数	619	総体積	8.26E+05
種 類 数	14	(μm ³)	

- 注1) 細胞数の単位は(細胞/ml)
ただし * 印の種は群体数(群体/ml)
- 注2) 優占種は◎が第1優占種、○が第2優占種
数字は各綱ごとの占有率(単位:%)
- 注3) 細胞体積は、顕微鏡観察による画像から
試験的に推定した概算値である。



ピコ植物プランクトン
1,000倍G励起で撮影

(3) 見つかったピコ植物プランクトンとその数(細胞数)

ピコ植物プランクトン数	11月15日 細胞数/ml
藍藻類 <i>Synechococcus</i> sp.	14,000

注1) プランクトンを大きさ別に分類したとき、大きさが0.2~2μm(1μmは1mmの1,000分の1)の最も小さなランクのものをピコプランクトンと呼んでいます。この中で光合成色素を持つものをピコ植物プランクトンと呼んでいます。ピコ植物プランクトンは細菌と同じくらい小さいので、落射蛍光顕微鏡を用いて観察し計数します。