

瀬田川プランクトン調査結果速報

滋賀県立衛生環境センター
琵琶湖水質担当
昭和60年8月20 第19報

植物プランクトン

(綱) 種 名	細胞数 (群体数)	優占種(占有率)	
		数	体積
(藍) <i>Anabaena spiroides*</i>	60		
(藍) <i>Anabaena macrospora*</i>	220		
(藍) <i>Anabaena affinis*</i>	160		
(藍) <i>Anabaena sp.*</i>	60		
(藍) <i>Phormidium tenue*</i>	60		
(珪) <i>Melosira granulata</i>	1640	◎	○
(珪) <i>Melosira granulata var. angustissima</i>	160		
(珪) <i>Melosira italica</i>	380		
(珪) <i>Fragilaria crotonensis</i>	200		
(珪) <i>Nitzschia holsatica</i>	80		
(珪) <i>Nitzschia acicularis</i>	60		
(珪) <i>Nitzschia sp.</i>	40		
(褐) <i>Cryptomonas sp.</i>	20		
(緑) <i>Pediastrum biwae</i>	640	○	
(緑) <i>Staurastrum dorsidentiferum var. ornatum</i>	80		◎
(藍) 藍藻綱	560	14.5	27.3
(黄) 黄緑藻綱	0	0.0	0.0
(黄鞭) 黄色鞭毛藻綱	0	0.0	0.0
(珪) 珪藻綱	2560	66.3	35.0
(渦) 渦鞭毛藻綱	0	0.0	0.0
(褐) 褐色鞭毛藻綱	20	0.5	0.4
(み) みどり虫藻綱	0	0.0	0.0
(緑) 緑藻綱	720	18.7	37.3
(他) その他のプランクトン	0	0.0	0.0
総細胞数	3860	総体積 (μm^3)	8.57E+06
種類数	15		

- 注1) 細胞数の単位は(細胞/ml)
ただし*印の種は群体数(群体/ml)
- 注2) 優占種は◎が第1優占種、○が第2優占種
数字は各綱ごとの占有率(単位:%)
- 注3) 細胞体積は、顕微鏡観察による画像から
試験的に推定した概算値である。

植物プランクトン優占種

第1優占種		細胞数 (細胞数/ml)
珪藻綱	<i>Melosira granulata</i>	1640

第2優占種		細胞数 (細胞数/ml)
緑藻綱	<i>Pediastrum biwae</i>	640


植物プランクトン第1優占種



Melosira granulata
(メロシラグラヌラータ)
珪藻綱

細胞は円筒形で、糸状の群体を形成する。群体の両端に顕著な長い剛毛を1~3本有する。

植物プランクトン第2優占種



Pediastrum biwae
(ピワクンショウモ)
緑藻綱

16, 32, 64細胞からなる群体を形成する。各細胞は1本の角状突起を持ち、突起同士が対をなすのが特徴である。琵琶湖の固有種とされ、ピワクンショウモと呼ばれている。