

瀬田川プランクトン調査結果速報

滋賀県立衛生環境センター
琵琶湖水質担当
平成6年3月7日

第49報

植物プランクトン

(綱) 種 名	細胞数 (群体数)	優占種(占有率)	
		数	体積
(黄鞭) <i>Dinobryon bavaricum</i>	20		
(黄鞭) <i>Dinobryon sp.</i>	20		
(黄鞭) <i>Pseudokephyrion sp.</i>	60		
(黄鞭) <i>Chromulina sp.</i>	40		
(黄鞭) <i>Chrysamoeba radians</i>	40		
(珪) <i>Cyclotella glomerata</i>	20		
(珪) <i>Stephanodiscus sp.</i>	20		
(珪) <i>Fragilaria crotonensis</i>	150		
(珪) <i>Fragilaria sp.</i>	15		
(珪) <i>Asterionella formosa</i>	640	◎	○
(珪) <i>Synedra ulna var. Ramesi</i>	20		
(珪) <i>Acnanthes sp.</i>	20		
(珪) <i>Nitzschia acicularis</i>	40		
(渦) <i>Peridinium berolinense</i>	20		
(褐) <i>Cryptomonas sp.</i>	140		◎
(褐) <i>Rhodomonas sp.</i>	400	○	
(み) <i>Trachelomonas oblonga</i>	200		
(緑) <i>Chlamydomonas sp.</i>	140		
(緑) <i>Ankistrodesmus falcatus var. mirabile</i>	40		
(他) その他の植物プランクトン	20		
(藍) 藍藻綱	0	0.0	0.0
(黄) 黄緑藻綱	0	0.0	0.0
(黄鞭) 黄色鞭毛藻綱	180	8.7	11.2
(珪) 珪藻綱	925	44.8	41.5
(渦) 渦鞭毛藻綱	20	1.0	0.7
(褐) 褐色鞭毛藻綱	540	26.2	34.1
(み) みどり虫藻綱	200	9.7	2.2
(緑) 緑藻綱	180	8.7	10.3
(他) その他のプランクトン	20	1.0	0.0
総細胞数	2065	総体積	8.97E+05
種類数	20	(μm^3)	


- 注1) 細胞数の単位は(細胞/ml)
ただし*印の種は群体数(群体/ml)
注2) 優占種は◎が第1優占種、○が第2優占種
数字は各綱ごとの占有率(単位:%)
注3) 細胞体積は、顕微鏡観察による画像から
試験的に推定した概算値である。

植物プランクトン優占種

第 1 優 占 種		細胞数 (細胞数/ml)
珪藻綱	<i>Asterionella formosa</i>	640

第 2 優 占 種		細胞数 (細胞数/ml)
褐色鞭毛藻綱	<i>Rhodomonas sp.</i>	400

植物プランクトン第1優占種



Asterionella formosa
(ホシガタケイソウ)
珪藻綱

4~32個の細胞が端で接着し、ホシガタの群体を作る。細胞の殻面を見ると(通常は殻環面が見えている)両端が丸くなった長い棒形をしている。琵琶湖では以前から多く見られる種類である。

植物プランクトン第2優占種



Rhodomonas sp.
(ロードモナス)
褐色鞭毛藻綱

細胞は、長楕円形で長さが約10 μm と小型であり、葉緑体は少し赤みを帯びている。
2本の鞭毛を有する。