

瀬田川プランクトン調査結果速報

滋賀県立衛生環境センター
琵琶湖水質担当
平成8年12月24日 第39報

植物プランクトン

(綱) 種 名	細胞数 (群体数)	優占種(占有率)	
		数	体積
(藍) <i>Chroococcus dispersus</i> *	5		
(藍) <i>Anabaena spiroides</i> *	2		
(黄鞭) <i>Uroglena americana</i>	840	◎	
(黄鞭) <i>Dinobryon divergens</i>	130		○
(黄鞭) <i>Dinobryon bavaricum</i>	20		
(黄鞭) <i>Pseudokephyrion</i> sp.	5		
(黄鞭) <i>Chryamoeba radians</i>	15		
(黄鞭) <i>Mallomonas tonsurata</i>	5		
(黄鞭) <i>Mallomonas</i> sp.	10		
(黄鞭) <i>Synura petersenii</i>	280		
(珪) <i>Melosira granulata</i>	4		
(珪) <i>Melosira granulata</i> var. <i>angustissima</i>	14		
(珪) <i>Cyclotella glomerata</i>	500		
(珪) <i>Skeletonema potamos</i>	280		
(珪) <i>Asterionella formosa</i>	20		
(珪) <i>Synedra rumpens</i>	5		
(珪) <i>Cocconeis plaecentula</i>	5		
(珪) <i>Nitzschia acicularis</i>	60		
(渦) <i>Peridinium berolinense</i>	10		
(褐) <i>Cryptomonas</i> sp.	200		◎
(褐) <i>Rhodomonas</i> sp.	600	○	
(み) <i>Trachelomonas oblonga</i>	5		
(緑) <i>Eudorina elegans</i>	32		
(緑) <i>Dictyosphaerium</i> sp.	40		
(緑) <i>Oocystis</i> sp.	20		
(緑) <i>Ankistrodesmus falcatus</i> var. <i>mirabile</i>	5		
(藍) 藍藻綱	7	0.2	0.9
(黄) 黄緑藻綱	0	0.0	0.0
(黄鞭) 黄色鞭毛藻綱	1305	41.9	48.1
(珪) 珪藻綱	888	28.5	17.6
(渦) 渦鞭毛藻綱	10	0.3	0.2
(褐) 褐色鞭毛藻綱	800	25.7	31.3
(み) みどり虫藻綱	5	0.2	0.0
(緑) 緑藻綱	97	3.1	1.9
(他) その他のプランクトン	0	0.0	0.0
総 細胞 数	3112		
種 類 数	26	総体積 (μm^3)	1.41E+06


- 注1) 細胞数の単位は(細胞/ml)
ただし*印の種は群体数(群体/ml)
注2) 優占種は◎が第1優占種、○が第2優占種
数字は各綱ごとの占有率(単位:%)
注3) 細胞体積は、顕微鏡観察による画像から
試験的に推定した概算値である。

植物プランクトン優占種

第 1 優 占 種		細胞数 (細胞数/ml)
黄色鞭毛藻綱	<i>Uroglena americana</i>	840

第 2 優 占 種		細胞数 (細胞数/ml)
褐色鞭毛藻綱	<i>Rhodomonas</i> sp.	600


植物プランクトン第1優占種



Uroglena americana
(ウログレナ)
黄色鞭毛藻類

楕円形の細胞が球状の寒天質の表層に規則正しく配列し、球状の群体を形成する。各細胞は不等長の2本の鞭毛を有する。

植物プランクトン第2優占種



Rhodomonas sp.
(ロドモナス)
褐色鞭毛藻綱

細胞は、長楕円形で長さが約 $10\mu\text{m}$ と小型であり、葉緑体は少し赤みを帯びている。2本の鞭毛を有する。