


瀬田川プランクトン調査結果速報

～第32報～

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター
環境監視部門 生物圏係
令和3年11月8日

1.最も数が多かった種類(優占種)


植物プランクトン第1優占種



Rhodomonas sp.
(ロドモナス)
褐色鞭毛藻綱

細胞は、長楕円形で長さが約10μmと小型であり、葉緑体は少し赤みを帯びている。2本の鞭毛を有する。


動物プランクトン第1優占種



Codonella cratera
(スナカラムシ)
繊毛虫類

壺のような固い殻を持ち、その殻は砂粒を含む。色は黒色で、前が開いていて、その後ろにくびれがある。殻の中に無色透明の繊毛虫が入っている。

2.計数された異臭味原因プランクトン



Uroglena americana

コメント

植物プランクトンは褐色鞭毛藻に属するロドモナス(*Rhodomonas* sp.)が先週に引き続き優占種となった。体積で見ると、黄色鞭毛藻類に属するマロモナス ファスティガータ(*Mallomonas fastigata*)が優占種となった。網別の体積では、黄色鞭毛藻綱が総体積の約41%、褐色鞭毛藻綱が約29%、緑色鞭毛藻綱が約23%を占めた。動物プランクトンは、繊毛虫類に属するスナカラムシ(*Codonella cratera*)が減少したものの460個体/Lで先週に引き続き優占種となった。ピコ植物プランクトンは減少して35,000細胞/mLとなり、輝橙色のものが88%、深赤色のものが12%であった。淡水赤潮の形成や生ぐさ臭の原因となるウログレナ アメリカーナ(*Uroglena americana*)が約2か月ぶりに計数され、300細胞/mLであった。

3.計数された主なプランクトンとその数(個体数)

(1)動物プランクトン

第 1 優 占 種		(個体/L)
繊毛虫類	<i>Codonella cratera</i>	460
第 2 優 占 種		(個体/L)
ワムシ類	<i>Polyarthra vulgaris</i>	300

* 個体数は、プランクトンネットNXXX25(目合い41μm)で1000倍濃縮したものを直接検鏡して計測した。

瀬田川植物プランクトン調査結果速報

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター
環境監視部門 生物圏係


(2) 植物プランクトン

令和3年11月8日

第32報

(綱) 種 名	細胞数 (群体数)	数		体積
		数	体積	
(藍) <i>Microcystis aeruginosa</i> *	1			
(黄鞭) <i>Uroglena americana</i> ★	300	○		
(黄鞭) <i>Dinobryon divergens</i>	80			
(黄鞭) <i>Chrysamoeba radians</i>	80			
(黄鞭) <i>Mallomonas fastigata</i>	40			◎
(珪) <i>Aulacoseira granulata</i>	26			
(珪) <i>Aulacoseira ambigua</i>	32			
(珪) <i>Cyclotella glomerata</i>	40			
(珪) <i>Cyclotella</i> sp.	20			
(珪) <i>Asterionella formosa</i>	2			
(珪) <i>Synedra acus</i>	2			
(珪) <i>Nitzschia acicularis</i>	20			
(褐) <i>Cryptomonas</i> sp.	200			
(褐) <i>Rhodomonas</i> sp.	580	◎		
(緑) <i>Ankistrodesmus</i> sp.	20			
(他) <i>Merotrichia capitata</i>	40			○
(藍) 藍藻綱	1	0.1	2.1	
(黄) 黄緑藻綱	0	0.0	0.0	
(黄鞭) 黄色鞭毛藻綱	500	33.7	40.7	
(珪) 珪藻綱	142	9.6	4.8	
(渦) 渦鞭毛藻綱	0	0.0	0.0	
(褐) 褐色鞭毛藻綱	780	52.6	28.6	
(み) みどり虫藻綱	0	0.0	0.0	
(緑) 緑藻綱	20	1.3	0.8	
(他) その他のプランクトン	40	2.7	23.0	
総 細 胞 数	1483	総体積	1.53E+06	
種 類 数	16	(μm^3)		

- 注1) 細胞数の単位は(細胞/mL)
ただし*印の種は群体数(群体/mL)
- 注2) 優占種は◎が第1優占種、○が第2優占種
数字は各綱ごとの占有率(単位: %)
- 注3) ★: 異臭味原因プランクトン
- 注4) 細胞体積は、顕微鏡観察による画像から
試験的に推定した概算値である。



ピコ植物プランクトン
1,000倍G励起で撮影

(3) 見つかったピコ植物プランクトンとその数(細胞数)

ピコ植物プランクトン数	細胞数/mL
藍藻類 <i>Synechococcus</i> sp.	35,000

注1) プランクトンを大きさ別に分類したとき、大きさが0.2~2 μm (1 μm は1mmの1,000分の1)の最も小さなランクのものをピコプランクトンと呼んでいます。この中で光合成色素を持つものをピコ植物プランクトンと呼んでいます。ピコ植物プランクトンは細菌と同じくらい小さいので、落射蛍光顕微鏡を用いて観察し計数します。G励起(緑色光照射)で輝橙色に輝く種類と深赤色に見える種類があります。