


瀬田川プランクトン調査結果速報

～第24報～

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター
環境監視部門 生物圏係
令和4年9月12日

1.最も数が多かった種類(優占種)

植物プランクトン第1優占種




Aulacoseira granulata

(アウラコセイラ)

珪藻綱

細胞は円筒形で、糸状の群体を形成する。殻の側壁に斜めに走る点紋列がある。群体の両端に顕著な長い棘状突起を有する。

動物プランクトン第1優占種



Codonella cratera

(スナカラムシ)

繊毛虫類

壺のような固い殻を持ち、その殻は砂粒を含む。色は黒色で、前が開いていて、その後ろにくびれがある。殻の中に無色透明の繊毛虫が入っている。

コメント

植物プランクトンは先週に引き続き、珪藻に属するアウラコセイラ グラヌラータ(*Aulacoseira granulata*)が細胞数、体積いずれで見ても優占種となった。綱別の体積では、珪藻が約53%、藍藻が約22%、次いで緑藻が約12%であった。動物プランクトンは繊毛虫類に属するスナカラムシ(*Codonella cratera*)が優占種となった。ピコ植物プランクトンは92,000細胞/mLとなり、輝橙色のものが約91%、深赤色のものが約9%であった。かび臭の原因となるフォルミディウム テヌエ(*Phormidium tenue*、物質:2-MIB)は今週は検出されていない。植物プランクトンが全体的に減少しており、藍藻も同様に減少している。今週の優占種のアウラコセイラには一部、増大胞子が確認された。増大胞子の確認や、藍藻の減少を見ると瀬田川にはもう秋が来ているのかもしれない。



増大胞子

珪藻は成長する際に、今ある殻の内側に新しい殻を作る。そのため成長するにつれて次第に細胞が細く小さくなる。しかしある時期になると小さくなった殻を大きな殻に戻すため、増大胞子を作成する。

2.計数された主なプランクトンとその数(個体数)

(1) 動物プランクトン

第 1 優 占 種		(個体/L)
繊毛虫類	<i>Codonella cratera</i>	360

第 2 優 占 種		(個体/L)
繊毛虫類	<i>Vorticella</i> sp.	140

* 個体数は、プランクトンネットNXXX25(目合い41μm)で1000倍濃縮したものを直接検鏡して計測した。

瀬田川植物プランクトン調査結果速報

～第24報～

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

環境監視部門 生物圏係

令和4年9月12日

(2) 植物プランクトン

(綱) 種 名	細胞数 (群体数)		
		数	体積
(藍) <i>Microcystis aeruginosa</i> *	4		○
(藍) <i>Microcystis wesenbergii</i> *	2		
(藍) <i>Aphanothece clathrata</i> *	40		
(藍) <i>Aphanizomenon flos-aquae</i> *	6		
(藍) <i>Anabaena spiroides</i> *	3		
(藍) <i>Anabaena affinis</i> *	7		
(黄鞭) <i>Mallomonas</i> sp.	40		
(珪) <i>Aulacoseira granulata</i>	310	◎	◎
(珪) <i>Aulacoseira granulata</i> var. <i>angustissima</i>	42		
(珪) <i>Aulacoseira ambigua</i>	6		
(珪) <i>Cyclotella glomerata</i>	40		
(珪) <i>Cyclotella</i> sp.	140	○	
(珪) <i>Stephanodiscus pseudosuzukii</i>	60		
(珪) <i>Acanthoceras zachariasii</i>	20		
(珪) <i>Nitzschia</i> sp.	20		
(渦) <i>Ceratium hirundinella</i>	1		
(褐) <i>Cryptomonas</i> sp.	40		
(褐) <i>Rhodomonas</i> sp.	40		
(み) <i>Trachelomonas</i> sp.	20		
(緑) <i>Chlamydomonas</i> sp.	80		
(緑) <i>Pandorina morum</i>	16		
(緑) <i>Eudorina elegans</i>	32		
(緑) <i>Ankistrodesmus</i> sp.	20		
(緑) <i>Monoraphidium tortile</i>	40		
(緑) <i>Scenedesmus</i> sp.	80		
(緑) <i>Closterium aciculare</i> var. <i>subprorum</i>	1		
(緑) <i>Staurostrum dorsidentiferum</i> var. <i>ornatum</i>	1		
(藍) 藍藻綱	62	5.6	22.1
(黄) 黄緑藻綱	0	0.0	0.0
(黄鞭) 黄色鞭毛藻綱	40	3.6	3.3
(珪) 珪藻綱	638	57.4	53.0
(渦) 渦鞭毛藻綱	1	0.1	2.7
(褐) 褐色鞭毛藻綱	80	7.2	6.6
(み) みどり虫藻綱	20	1.8	0.4
(緑) 緑藻綱	270	24.3	11.9
(他) その他のプランクトン	0	0.0	0.0
総 細 胞 数	1111	総体積 (μm^3)	1.13E+06
種 類 数	27		

- 注1) 細胞数の単位は(細胞/mL)
ただし * 印の種は群体数(群体/mL)
- 注2) 優占種は◎が第1優占種、○が第2優占種
数字は各綱ごとの占有率(単位: %)
- 注3) ★: 異臭味原因プランクトン
- 注4) 細胞体積は、顕微鏡観察による画像から
試験的に推定した概算値である。



ピコ植物プランクトン
1,000倍G励起で撮影

(3) 見つかったピコ植物プランクトンとその数(細胞数)

ピコ植物プランクトン数	細胞数/mL
藍藻類 <i>Synechococcus</i> sp.	92,000

注1) プランクトンを大きさ別に分類したとき、大きさが0.2～2 μm (1 μm は1mmの1,000分の1)の最も小さなランクのものをピコプランクトンと呼んでいます。この中で光合成色素を持つものをピコ植物プランクトンと呼んでいます。ピコ植物プランクトンは細菌と同じくらい小さいので、落射蛍光顕微鏡を用いて観察し計数します。G励起(緑色光照射)で輝橙色に輝く種類と深赤色に見える種類があります。