


瀬田川プランクトン調査結果速報

～第43報～

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター
環境監視部門 生物圏係
令和8年1月19日

1.最も数が多かった種類(優占種)

植物プランクトン第1優占種



Uroglena americana

(ウログレナ)
黄色鞭毛藻綱

楕円形または倒卵形の細胞が寒天質の表層に規則正しく配列し、球状の群体を形成します。また、各細胞は不等長の2本の鞭毛を有し、それらを動かして回転しながら遊泳します。生ぐさ臭のする物質を産生し、水道水の異臭味の原因となる藻類です。

動物プランクトン第1優占種



Polyarthra vulgaris

(ハネウデワムシ)
ワムシ類

体は四角く、4カ所に3本ずつ鳥の羽状の付属物を有しています。前部に2本の触角があります。琵琶湖、瀬田川で見られるワムシの中で、よく見られる種類の一つです。

コメント

植物プランクトンは、細胞数では黄色鞭毛藻に属するウログレナ(*Uroglena americana*)、体積では褐色鞭毛藻に属するクリプトモナス(*Cryptomonas* sp.)が優占種となりました。綱別の体積では、珪藻および褐色鞭毛藻が約33%、次いで黄色鞭毛藻が約18%となりました。動物プランクトンは、ワムシ類のハネウデワムシ(*Polyarthra vulgaris*)が優占種となりました。ピコ植物プランクトンは、今週は910細胞/mL(輝橙色:67%、深赤色:33%)と前回の調査から半分に減少しました。

今回の調査では前回同様優占種の構成が同一でしたが、ウログレナを含めた黄色鞭毛藻が減少した一方、珪藻が増加しており、植物プランクトンの体積比率が変化しました。今後もプランクトン相の動向が注目されます。

2.計数された主なプランクトンとその数(個体数)*

(1)動物プランクトン

第 1 優 占 種		(個体/L)
ワムシ類	<i>Polyarthra vulgaris</i>	140

第 2 優 占 種		(個体/L)
繊毛虫類	<i>Stokesia vernalis</i>	80

* 個体数は、プランクトンネットNXXX25(目合い41μm)で1000倍濃縮したものを直接検鏡して計測しました。

瀬田川植物プランクトン調査結果速報


～第43報～

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター
環境監視部門 生物圏係
令和8年1月19日

(2) 植物プランクトン

(綱) 種 名	細胞数 (群体数)		
		数	体積
(黄鞭) <i>Chrysamoeba radians</i>	80		
(黄鞭) <i>Mallomonas fastigata</i>	1		
(黄鞭) <i>Uroglena americana</i> ★	660	◎	○
(黄鞭) <i>Synura petersenii</i>	32		
(珪) <i>Cyclotella glomerata</i>	560	○	
(珪) <i>Cyclotella</i> sp.	180		
(珪) <i>Fragilaria crotonensis</i>	32		
(珪) <i>Fragilaria capucina</i>	80		
(珪) <i>Asterionella gracillima</i>	4		
(珪) <i>Synedra acus</i>	1		
(珪) <i>Cocconeis placentula</i>	20		
(珪) <i>Cymbella</i> sp.	20		
(珪) <i>Nitzschia</i> sp.	40		
(渦) <i>Gymnodinium</i> sp.	60		
(渦) <i>Peridinium</i> sp.	2		
(褐) <i>Cryptomonas</i> sp.	200		◎
(褐) <i>Rhodomonas</i> sp.	400		
(緑) <i>Chlamydomonas</i> sp.	20		
(緑) <i>Tetraspora lacustris</i>	32		
(緑) <i>Scenedesmus</i> sp.	160		
(緑) <i>Staurastrum dorsidentiferum</i> var. <i>ornatum</i>	1		
(他) <i>Merotrichia capitata</i>	3		
(藍) 藍藻綱	0	0.0	0.0
(黄) 黄緑藻綱	0	0.0	0.0
(黄鞭) 黄色鞭毛藻綱	773	29.9	18.0
(珪) 珪藻綱	937	36.2	33.2
(渦) 渦鞭毛藻綱	62	2.4	7.1
(褐) 褐色鞭毛藻綱	600	23.2	33.3
(み) みどり虫藻綱	0	0.0	0.0
(緑) 緑藻綱	213	8.2	5.9
(他) その他のプランクトン	3	0.1	2.4
総細胞数	2588	総体積	1.22E+06
種類数	22	(μm^3)	

- 注1) 細胞数の単位は(細胞/mL)
ただし * 印の種は群体数(群体/mL)
- 注2) 優占種は◎が第1優占種、○が第2優占種
数字は各綱ごとの占有率(単位:%)
- 注3) ★: 異臭味原因プランクトン
- 注4) 細胞体積は、顕微鏡観察による画像から
試験的に推定した概算値です。



ピコ植物プランクトン
1,000倍G励起で撮影
(倍率: 10×20倍)

(3) 見つかったピコ植物プランクトンとその数(細胞数)

ピコ植物プランクトン数	細胞数/mL
(藍) <i>Synechococcus</i> sp.	910

注1) プランクトンを大きさ別に分類したとき、大きさが0.2~2 μm (1 μm は1mmの1,000分の1)の最も小さなランクのものをピコプランクトンと呼んでいます。この中で光合成色素を持つものをピコ植物プランクトンと呼んでいます。ピコ植物プランクトンは細菌と同じくらい小さいので、落射蛍光顕微鏡を用いて観察し計数します。G励起(緑色光照射)で輝橙色に輝く種類と深赤色に見える種類があります。